

GÁSTRICOS



LABORATORIOS
DELTA S.A.

Contenido

NOSOTROS	3
DELTAGEL NF	4
RANITIDINA	6
ESPASMODOL	8
TECNOLOGÍA	10
P-PRA	12
E-PRA	14
OMEPRAZOL	16
MINI VADEMECUM	17

SOBRE NOSOTROS

Laboratorios Delta S.A., es una industria farmacéutica dedicada a la formulación, fabricación y comercialización de medicamentos de calidad a precios al alcance de la población. Estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos; utilizando materiales con altos estándares, aplicando las buenas prácticas de manufactura dentro de todos nuestros procesos y fortaleciendo la cultura de seguridad industrial y salud ocupacional en nuestro personal.

Nuestro compromiso de mejora continua, se refleja en infraestructura, tecnología innovadora, en la capacitación permanente a nuestro personal y en el perfeccionamiento de nuestros procesos de producción, para garantizar productos que brinden salud y bienestar a nuestros clientes.



DELTAGEL NF

Hidróxido de Aluminio 200mg

Hidróxido de Magnesio 200mg

SUSPENSIÓN

- ▲ Antiácido
- ▲ Para el tratamiento o alivio de la acidez o calor estomacal
- ▲ Para adultos, tomar 10 ml a 20 ml una hora después de cada comida y al acostarse
- ▲ No administrar en casos de hipersensibilidad a los componentes del medicamento
- ▲ Este medicamento contiene Propilenglicol
- ▲ Fácil administración
- ▲ Apto para diabéticos
- ▲ Agradable sabor refrescante a Mentol
- ▲ Fabricado por: Laboratorio Químico Farmacéutico Industrial Delta S.A.



**Una Fórmula
perfectamente
equilibrada**



RAMITIDINA

150mg y 300mg

COMPRIMIDO RECUBIERTO



- ▲ Antiulceroso
- ▲ Para el tratamiento de la úlcera péptica, gastritis aguda severa, reflujo gastroesofágico
- ▲ Dosis máxima: 300 mg al día.
- ▲ Este producto contiene Glicerina
- ▲ Fabricado por: Laboratorio Químico Farmacéutico Industrial Delta S.A.


**Acción efectiva
contra el reflujo
gastroesofágico**



- ESPASMODOL

N-Butil Bromuro de Hioscina 10mg

COMPRIMIDO RECUBIERTO




- ESPASMODOL COMPUESTO

N-Butil Bromuro de Hioscina 10mg

Paracetamol 500mg

COMPRIMIDO RECUBIERTO



- Espasmodol: Antiespasmódico
- Espasmodol compuesto: Antiespasmódico y analgésico
- Para afecciones espasmódicas y dolorosas de las vías biliares
- 1 a 2 comprimidos 3 veces al día
- Dosis máxima diaria: hasta 6 comprimidos al día
- Este medicamento contiene Glicerina
- Fabricado por: Laboratorio Químico Farmacéutico Industrial Delta S.A.

Fórmula completamente eficaz



TECNOLOGÍA



Encapsuladora ACG AF 90



Línea de Empaque
Blíster + Estuchadora
ELMACH EPI 3015 PDA



Línea de Granulado
Highshear + Fluid Bed Dryer
AIRPLAN

Nos enorgullecemos de contar con
mano de obra Boliviana y Tecnología
de punta para la fabricación de
nuestros Medicamentos.

P-PRA

Pantoprazol

40mg

Comprimido con recubierta entérica de liberación retardada

- ▲ Antiulceroso
- ▲ Tratamiento a corto plazo de úlcera duodenal y úlcera gástrica
- ▲ Tratamiento del síndrome de Zollinger Ellison
- ▲ Ingerir el comprimido entero con abundante agua y NO debe ser masticado ni triturado
- ▲ Este producto contiene Aceite de castor
- ▲ **Fabricado por:** Brawn Laboratories Limited 13, NIT, Industrial Area, Faridabad-121001 Haryana, India. **Para:** Laboratorio Químico Farmacéutico Industrial Delta S.A.

Tratamiento efectivo contra la acidez estomacal



E-PRA

Esomeprazol

40mg

COMPRIMIDO RECUBIERTO

- ▲ Antiulceroso
- ▲ Tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva por reflujo
- ▲ Tratamiento del síndrome de Zollinger Ellison
- ▲ Para adultos y adolescentes a partir de los 12 años
- ▲ Ingerir el comprimido entero con abundante agua y NO debe ser masticado ni triturado
- ▲ No deben tomar este medicamento pacientes con intolerancia a la fructosa
- ▲ **Fabricado por:** Brawn Laboratories Limited 13, NIT, Industrial Area, Faridabad-121001 Haryana, India. **Para:** Laboratorio Químico Farmacéutico Industrial Delta S.A.




Máxima utilidad Antiulcerosa



OMEPRAZOL

20mg y 40mg
CÁPSULAS



- ▲ Antiulceroso, inhibidor de la bomba de protones
- ▲ Para el tratamiento a corto y largo plazo de la úlcera duodenal, gástrica y por stress
- ▲ Tratamiento para el síndrome de Zollinger-Ellison
- ▲ Vía de administración: Oral
- ▲ Cápsulas duras de gelatina
- ▲ Fabricado por: Laboratorio Químico Farmacéutico Industrial Delta S.A.

**Contra la acidez
estomacal**



MINI-VADEMECUM

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACCIÓN TERAPÉUTICA	PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS
Antiácidos/Antiulcerosos	Deltagel NF Suspension Hidróxido de Aluminio 200 mg + Hidróxido de Magnesio 200 mg	Antiácido	Frasco PET x 100 ml. Caja x 1 frasco. Incluye cucharilla dosificadora	Para el tratamiento o alivio de acidez o calor estomacal, la indigestión ácida y los malestares estomacales en pacientes con úlcera péptica, gastritis, esofagitis, hernia hiatal o hiperacidez gástrica.	Adultos: 10 ml a 20 ml una hora después de cada alimento o al acostarse. No superar las seis tomas en 24 horas
	Ranitidina 150 mg Comprimidos Ranitidina HCl 150 mg	Antiulceroso	Folio Aluminio x 10 comprimidos con recubierta. Caja x 100 comprimidos	Tratamiento de úlcera péptica, gastritis aguda severa, reflujo gástricoesofágico. Síndrome de Zollinger-Ellison, hemorragia digestiva alta. Profilaxis de úlcera por estrés.	Adultos: Un comprimido cada doce horas o dos comprimidos por la noche. Dosis máxima 300 mg. Duración del tratamiento: 6 a 8 semanas o según prescripción del médico.
	Ranitidina 300 mg Comprimidos Ranitidina HCl 300 mg	Antiulceroso	Folio aluminio x 10 comprimidos con recubierta. Caja x 100 comprimidos	Tratamiento de úlcera péptica, gastritis aguda severa, reflujo gástricoesofágico. Síndrome de Zollinger-Ellison, hemorragia digestiva alta. Profilaxis de úlcera por estrés.	Adultos: 150 mg cada 12 horas ó 300 mg por la noche. Dosis máxima: 300 mg/día. Duración del tratamiento: 6 a 8 semanas ó según prescripción del médico
	P-PRA 40 mg Comprimido Pantoprazol 40 mg	Antiulceroso. Inhibidor de la bomba de protones	Blíster Alu-Alu x 10 comprimidos con recubierta entérica de liberación retardada. Caja x 30 comprimidos	Tratamiento a corto plazo de la úlcera duodenal, la úlcera gástrica y formas moderadas y graves de esofagitis por reflujo. Si se ha demostrado que la úlcera duodenal está asociada con la infección por Helicobacter pylori, puede ser útil en combinación con los antibióticos apropiados. Para el tratamiento del Síndrome de Zollinger-Ellison.	Úlcera duodenal: La dosis recomendada es de 40 mg una vez al día durante 2 a 4 semanas. Úlcera gástrica: dosis recomendada es de 40 mg una vez al día durante 4 a 8 semanas. Esofagitis por reflujo: La dosis recomendada es de 40 mg una vez al día por la mañana durante 4 a 8 semanas. Asociado con antibióticos: 40 mg dos veces al día. Dosis máxima diaria: 80mg.
Antiulceroso	E-PRA 40 mg Comprimido Esomeprazol 40 mg	Antiulceroso. Inhibidor de la bomba de protones	Blíster Alu-Alu x 10 comprimidos con recubierta entérica. Caja x 30 comprimidos	Enfermedad por reflujo gástricoesofágico (ERGE), tratamiento de la esofagitis erosiva por reflujo. Tratamiento a largo plazo de pacientes con esofagitis curada para prevenir recaídas, tratamiento sintomático de la enfermedad por reflujo gástricoesofágico (ERGE), en combinación con regímenes terapéuticos antibacterianos apropiados para la erradicación de Helicobacter pylori y curación de la úlcera duodenal asociada a Helicobacter pylori. Prevención de la recaída de las úlceras pépticas con úlceras asociadas a Helicobacter pylori. Tratamiento continuo con AINE: Curación de úlceras gástricas asociadas con la terapia con AINE. Prevención de úlceras gástricas y duodenales asociadas con la terapia con AINE, en pacientes en riesgo. Tratamiento del síndrome de Zollinger Ellison.	La dosis recomendada es de 40 mg dos veces al día, de acuerdo a la necesidad del paciente. Dosis máxima 80 mg por día.

MINI-VADEMECUM

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	ACCIÓN TERAPÉUTICA	PRESENTACIÓN	INDICACIONES	DOSIS
Antiulceroso	Omeprazol 20 mg Cápsulas Omeprazol 20 mg	Antiulceroso Inhibidor de la bomba de protones	Blister PVC-Al x 10 cápsulas. Caja x 50 Cápsulas	Para el tratamiento y prevención a corto y largo plazo de los signos y síntomas relacionados con los trastornos ácido-peptico. Ulceras duodenales, úlceras gástricas, úlceras por estrés, tratamiento de esofagitis péptica, síndrome de Zollinger Ellison, esofagitis por reflujo, esofagitis erosiva grave asociada a reflujo gástricoesofágico, hipergastrinemias de diversas causas.	Úlcera gástrica: 20 mg/día por 4 a 6 semanas, si no se ha producido curación, adicionar 4 semanas de tratamiento. Úlcera duodenal: 20mg/día por 4 a 6 semanas. Esofagitis severa por reflujo: 40 mg/día por 4 semanas, si no ha habido cicatrización, incrementar 4 semanas. Reflujo gástricoesofágico: 20 mg/día por 4 a 8 semanas. Síndrome de Zollinger Ellison y adenomas Endocrinos Multiples: 60 mg/día por períodos clínicamente indicados.
	Omeprazol 40 mg Cápsulas Omeprazol 40 mg	Antiulceroso Inhibidor de la bomba de protones	Blister PVC-Al x 10 cápsulas. Caja x 20 Cápsulas	Para el tratamiento y prevención a corto y largo plazo de los signos y síntomas relacionados con los trastornos ácido-peptico. Ulceras duodenales, úlceras gástricas, úlceras por estrés, tratamiento de esofagitis péptica, síndrome de Zollinger Ellison, esofagitis por reflujo, esofagitis erosiva grave asociada a reflujo gástricoesofágico, hipergastrinemias de diversas causas.	Úlcera gástrica: 20 mg/día por 4 a 6 semanas, si no se ha producido curación, adicionar 4 semanas de tratamiento. Úlcera duodenal: 20mg/día por 4 a 6 semanas. Esofagitis severa por reflujo: 40 mg/día por 4 semanas, si no ha habido cicatrización, incrementar 4 semanas. Reflujo gástricoesofágico: 20 mg/día por 4 a 8 semanas. Síndrome de Zollinger Ellison y adenomas Endocrinos Multiples: 60 mg/día por períodos clínicamente indicados.
Antiespasmódico	Espasmodol Compuesto Comprimidos N-Butilbromuro de Hioscina 10 mg + Paracetamol 500 mg	Antiespasmódico Analgésico	Blister PVC-Al x 10 Comprimidos. Caja x 100 Comprimidos	Indicado para afecciones espasmódicas de las vías biliares, esófago, gastroduodenitis, espasmo del piloro, cólicos nefríticos uretrales y vías urinarias.	Adultos: 1 a 2 comprimidos 3 veces al día. Dosis máxima diaria hasta 6 comprimidos.
	Espasmodol 10 mg Comprimidos N-Butilbromuro de Hioscina 10 mg	Antiespasmódico	Blister PVC-Al x 10 Comprimidos. Caja x 50 Comprimidos	Indicado para afecciones espasmódicas de las vías biliares, esófago, gastroduodenitis, espasmo del piloro, cólicos nefríticos como espasmos dolorosos de las vías urinarias.	Adultos: 1 a 2 comprimidos cada 6 a 8 horas. Dosis máxima diaria hasta 6 comprimidos.

Oficina Central - La Paz

Calle Presbítero Medina
esq. Pasaje Taltal #2
Sopocachi
La Paz - Bolivia

Telfs. +591 (2) 241 18 45 - 211 15 55
Cel. +591 698 29 357
casilla: 10206
ventaslpz@laboratoriosdelta.net

Planta - La Paz

Calle Reseguin
#2122 - 26
Sopocachi
La Paz - Bolivia

Telfs. +591 (2) 241 07 47
consultas@laboratoriosdelta.net

Planta - Viacha

Carretera Viacha
Zona Tilata - Urbanización Jardín
#2454
La Paz - Bolivia

Telfs. +591 (2) 241 18 45 - 211 15 55
Cel. +591 788 97 395
consultas@laboratoriosdelta.net

Sucursal - Santa Cruz

Av. 26 de Febrero #636
Segundo Anillo
Santa Cruz - Bolivia

Telfs. +591 (3) 3 26 21 37
Cel. +591 721 68 358
ventasscz@laboratoriosdelta.net

Sucursal - Cochabamba

Calle Tarija
Esquina Portales #1408
Queru Queru
Cochabamba - Bolivia

Telfs. +591 (4) 414 19 32
Cel. +591 674 05 928
ventascbba@laboratoriosdelta.net



Laboratorios Delta S.A.



laboratoriosdelta.bo



www.laboratoriosdelta.net



LABORATORIOS
DELTA S.A.